

Octubre 2025

INFORME **ENCUESTA**

PERCEPCIÓN DE LA VACUNACIÓN EN EL
PACIENTE ONCOLÓGICO

CONTENIDOS

01. Participantes

02. Resultados


03. Conclusiones

PARTICIPANTES


PERFIL DEL PACIENTE ENCUESTADO

N = 174

El 88% de los encuestados son pacientes oncológicos o supervivientes de cáncer



El 71% de los pacientes tienen >50 años




1. Nos gustaría conocer la situación por la que te ha llegado esta encuesta (respuesta única) / 2. ¿Cuál es tu edad (años)? (respuesta única)


PERFIL DEL PACIENTE ENCUESTADO

N = 174

La gran mayoría (86%) son mujeres



El 55% cuenta con estudios universitarios o superiores




3. ¿Cuál es tu sexo?(respuesta única) / 4. ¿Cuál es el nivel más alto de estudios que has finalizado? (respuesta única)

PERFIL DEL PACIENTE ENCUESTADO

N = 174

Amplia representación geográfica




5. Por favor, indica a continuación la Comunidad autónoma en la que resides actualmente (respuesta única)

DIAGNÓSTICO DEL PACIENTE

N = 174

El 45% de los pacientes tiene más de 5 años desde el diagnóstico. La mayoría se encuentra dentro del rango de uno a cinco años desde su diagnóstico.




6. ¿Hace cuanto tiempo te diagnosticaron cáncer a ti o a tu familia? (respuesta única)


DIAGNÓSTICO DEL PACIENTE

N = 174

El tipo de cáncer más común entre los encuestados es el de mama (51,7%), seguido de los sanguíneos (13,8%) y ginecológicos (11,5%).




La gran mayoría (94%) de los encuestados indicó un único tipo de tumor, mientras que solo un 3% mencionó dos, un 2% tres y apenas un 1% cuatro tipos.



PERFIL DEL PACIENTE ENCUESTADO

N = 174

La mayoría (51%) no está recibiendo tratamiento en el momento en el que se le encuestó, de los que si reciben tratamiento la hormonoterapia es el más habitual (21%) seguido por la quimioterapia (18%)




8. ¿Qué tipo de tratamientos estás recibiendo actualmente? Selecciona todos los que apliquen

PERFIL DEL PACIENTE ENCUESTADO

N = 174

El 31% de los encuestados continúa en tratamiento activo. Entre los que se encuentran en remisión, la proporción más elevada (23 %) corresponde a individuos con un intervalo libre de enfermedad de entre 2 y 5 años.



9. ¿Desde hace cuánto tiempo estás o está tu familiar libre de cáncer?

RESULTADOS


CONCIENCIACIÓN SOBRE LA VACUNACIÓN

CONCIENCIACIÓN SOBRE LA RECOMENDACIÓN DE LA VACUNACIÓN

N = 174

Más de la mitad de los encuestados (51%) declara no conocer la existencia de vacunas recomendadas para prevenir otras enfermedades que no sean el COVID-19

Conocimiento sobre la existencia de vacunas recomendadas para prevenir otras enfermedades diferentes al COVID-19




12. ¿Conoces que existen vacunas recomendadas y disponibles para prevenir otras enfermedades que no sean el COVID-19, para las personas que tienen o han tenido cáncer?.

IMPORTANCIA OTORGADA A LA VACUNACIÓN

N = 174

La vacunación se percibe como relevante en pacientes oncológicos, destacando Hepatitis B (64,4%), VPH (62,6%) y Neumococo (59,8%) como las más prioritarias, frente a gripe estacional (49,4%) y Covid-19 (44,8%) con menor importancia.




11. A continuación, se presentará una lista de infecciones que pueden prevenirse mediante vacunas. Por favor, valora cada una, en una escala del 0 al 5, donde 0 significa “nada relevante” y 5 significa “muy relevante”, según la importancia que le das a prevenirlas.

OPINIONES SOBRE LAS VACUNAS

N = 174

La mayoría confía en la eficacia y necesidad de las vacunas (entre el 82% y el 90% está de acuerdo), aunque solo el 51,7% está muy de acuerdo en que son necesarias por el riesgo aumentado en pacientes con cáncer. No se observan barreras evidentes, pero tampoco surge un incentivo claro que actúe como motor de decisión




14. A continuación, se presentarán una serie de afirmaciones relacionadas con las vacunas y la vacunación en el contexto del cáncer. Por favor, lee cada una con atención e indica el grado en que estás de acuerdo o en desacuerdo.

VACUNAS ADMINISTRADAS

N = 174

La gripe (58,6%), la COVID (42,5%) y el Neumococo (35,6%) son las vacunas más administradas, mientras que VRS (4%) y VPH (13,8%) presentan las coberturas más bajas. in embargo, existe un interés significativo por herpes zóster (31%) y VRS (29,3%), lo que indica oportunidades para mejorar la información y el acceso en estas áreas.

Vacunas que los pacientes encuestados refieren haberse administrado




20. Por favor, indica si se te ha administrado (o a tu familiar) alguna de estas vacunas. (Respuesta simple)

CONOCIMIENTO Y FORMACION DE LA VACUNACION

N = 174

Solo la mitad de los pacientes (51%) considera tener conocimiento suficiente para decidir vacunarse, mientras que un 34% se muestra indeciso y un 15% reconoce falta de información, evidenciando la necesidad de reforzar la educación sobre vacunación




15. Por favor selecciona qué tan de acuerdo estás con la siguiente afirmación: “Considero que el conocimiento en vacunas que tengo es adecuado para decidir si debo vacunarme”.

ESTRATEGIAS DE CUIDADO DE SALUD Y RELEVANCIA

N = 174

La mayoría considera esenciales las estrategias de cuidado de la salud, destacando evitar el consumo de drogas (68%), bienestar emocional (57%), alimentación saludable (56%) y ejercicio físico (56%). La vacunación, aunque relevante (90% entre muy importante e imprescindible), no alcanza el nivel de prioridad de otras acciones.



10. Evalúa las siguientes estrategias de cuidado de tu salud en el contexto del cáncer según las consideres más o menos importantes.

RESULTADOS


PERCEPCIÓN Y ACTITUDES HACIA LA VACUNACIÓN

PROACTIVIDAD ANTE RECOMENDACIÓN SOBRE VACUNACIÓN EN CONSULTA

N = 174

La mayoría (54%) de los pacientes ha consultado en algún momento de proactiva a su oncólogo/hematólogo sobre la vacunación

¿Has preguntado a tu oncólogo/a y/o hematólogo/a sobre vacunas?




16. ¿Has preguntado proactivamente a tu oncólogo/a y/o hematólogo/a por asesoramiento/ recomendación sobre vacunas?

PROFESIONAL RESPONSABLE DE RECOMENDAR VACUNACION

N = 174

La amplia mayoría (74,1%) considera que el oncólogo debe ser el principal responsable de recomendar la vacunación. En segundo lugar, se menciona al médico de atención primaria (47,7%) y, con menor frecuencia, a profesionales de medicina preventiva (28,7%) o enfermería oncológica (26,4%)




17. Piensa en vacunas que se administren en función de la medicación que recibes y no en aquéllas que se administran de forma estacional todos los años
¿Qué profesional consideras que es el responsable de recomendarte e informarte sobre estas vacunas? Selecciona todos los que apliquen:

VIAS PARA RECIBIR INFORMACION

N = 174

La información sobre vacunación proviene sobre todo de profesionales sanitarios: enfermería y médico de atención primaria (17,2% cada uno) y oncólogo/a (16,7%). Otros canales, como información en centros de salud y medios de comunicación, se sitúan en torno al 8%, mientras que webs oficiales y redes sociales alcanzan cerca del 6%.




13. ¿A través de qué vías has recibido información sobre vacunas? Selecciona todas las que apliquen:

VÍAS PARA RECEBIR INFORMACIÓN SOBRE VACUNACIÓN

N = 174

Casi todos los pacientes encuestados prefieren informarse sobre la vacunación a través de un profesional sanitario, principalmente su oncólogo/a (82,8%), seguido por el médico de atención primaria (71,8%) y la enfermería de atención primaria (42,5%). Otros canales, como webs oficiales (32,8%) o información en hospitales (32,8%), son menos mencionados.




BARRERAS PARA LA VACUNACIÓN

N = 174

Entre los motivos más influyentes para no vacunarse destacan que el especialista desaconseje la vacunación (47,1%) y la falta de recomendación por parte del oncólogo/hematólogo (47,1%). También influyen el miedo a los efectos secundarios (43,1%), motivos personales o ideológicos (36,8%) y movimientos antivacunas (38,5%).

Motivos para el rechazo de la vacunación en pacientes con cáncer

0 (No influye en absoluto) 1 2 3 4 5 (Influye totalmente)




18. De los siguientes motivos, indica cuáles consideras que podrían influir en que un paciente o superviviente de cáncer rechace vacunarse. Utiliza una escala de 0 a 5, donde 0 significa “no influye en absoluto” y 5 “influye totalmente”.

ACTITUD HACIA LA VACUNACIÓN

N = 174

La mayoría de los pacientes (85%) nunca ha rechazado una vacuna, mientras que solo un 15% indica que sí lo ha hecho en alguna ocasión




19. ¿Has rechazado recibir alguna vacuna que te hayan recomendado/prescrito?

OPORTUNIDADES PARA LA VACUNACION

N = 174

En la opinión de los encuestados, la recomendación activa del oncólogo/hematólogo (90%) y la implicación del centro de salud (63%) son las acciones con mayor impacto para mejorar la cobertura en vacunación, seguidas por la participación de enfermería (61%) y la entrega de materiales informativos (53%)



21. ¿Qué acciones de las siguientes consideras que tendrían un impacto positivo para que más pacientes o supervivientes de cáncer se vacunen? Selecciona todas las que apliquen:


CONCLUSIONES

PRINCIPALES MENSAJES Y RECOMENDACIONES

OPINIÓN SOBRE LA ENCUESTA

N = 174

El 86% de los pacientes consideran que la encuesta es de gran utilidad, ya que las vacunas son importantes para ellos.



23. Finalmente, ¿qué opinas sobre esta encuesta?

CONCLUSIONES PRINCIPALES



Papel central del oncólogo: El oncólogo/hematólogo se consolida como la figura central en la vacunación de pacientes oncológicos. El **74,1%** considera que debe ser el principal responsable de recomendar las vacunas y el **82,8%** prefiere recibir la información directamente de él, por encima de otros canales como el médico de atención primaria (71,8%) o la enfermería (42,5%).

Sin embargo, en la práctica, solo **un 16,7%** de los pacientes afirma haber recibido información sobre vacunación desde su oncólogo, siendo superado por Atención Primaria (17,2%). Esta brecha entre la expectativa y la realidad revela una oportunidad crítica: el **90%** de los encuestados identifica la **recomendación activa del oncólogo/hematólogo** como la acción con mayor impacto para mejorar la cobertura vacunal. Integrar la vacunación en la práctica clínica oncológica no solo refuerza la confianza del paciente, sino que puede convertirse en el motor más eficaz para incrementar la adherencia.



Alto nivel de valoración, pero conocimiento limitado: La vacunación se percibe como relevante en pacientes oncológicos (90% la considera importante), con confianza alta en su eficacia (82%-90%). Sin embargo, más de la mitad (51%) desconoce la existencia de vacunas preventivas más allá de COVID-19, lo que evidencia un conocimiento desigual.



Barreras ligadas a comunicación clínica: Los principales motivos para no vacunarse no son desconfianza, sino falta de recomendación médica (47,1%) o desaconsejo del especialista (47,1%). También influyen miedo a efectos secundarios (43,1%) y factores ideológicos (36,8%), lo que refleja la necesidad de mejorar la comunicación.



Oportunidades para mejorar la cobertura: Los pacientes valoran la recomendación activa del oncólogo (90%) como la acción más efectiva, seguida por la implicación del centro de salud (63%), enfermería (61%) y entrega de materiales informativos (53%). Reducir listas de espera y participación de farmacia hospitalaria tienen menor impacto (24%).